

Ginkgo-B 60

Ginkgo biloba

COMPOSITION

Ginkgo-B 60 Capsule: Each capsule contains *Ginkgo biloba* extract 60 mg.

PHARMACOLOGY

The extract of the Ginkgo leaf contains flavonoid glycosides and terpenoids (ginkgolides, bilobalides) which inhibits binding of platelet activating factor (PAF) to platelets resulting in inhibited platelet aggregation and increased blood fluidity; reduces thrombosis, improvements in cognition, working memory, short-term visual memory in dementia, short-term memory in cerebral insufficiency, concentration and attention.

INDICATIONS

- Cerebral insufficiency - Memory deficit, poor concentration, depression, memory loss
- Peripheral vascular disease
- Vertigo & Tinnitus (Ringing in the ear)

Other Uses

- Protective action in hypoxia
- Acute cochlear deafness
- Sexual dysfunction associated with SSRI use

DOSAGE & ADMINISTRATION

Ginkgo-B 60: 1-2 capsules 2-3 times daily or as directed by the physician

Duration of administration: Cerebral insufficiency-at least 8 weeks, Peripheral vascular disease- at least 8 weeks, Vertigo & Tinnitus-at least 6-8 weeks.

CONTRA-INDICATION

Ginkgo biloba should not be used in any patient known to be allergic to it or any of its constituents.

WARNING & PRECAUTION

Consider discontinuing *Ginkgo biloba* prior to elective surgery as it may increase the risk of postoperative bleeding.

SIDE EFFECTS

Stomach or intestinal upset, headache or allergic skin reaction in rare cases.

USE IN PREGNANCY & LACTATION

No known restriction.

USE IN CHILDREN & ADOLESCENTS

In children under 12 years 120 mg dosage should not be used.

DRUG INTERACTION

Anticoagulants, antiplatelet agents, heparin and thrombolytic agents may increase the risk of bleeding complications.

OVERDOSE

May increase the bleeding time and the risk of spontaneous hemorrhage.

STORAGE

Store below 30°C & keep in dry place, away from direct light. Keep out of the reach of children.

PACKING

Ginkgo-B 60 Capsule: Each HDPE container contains 30 capsules.

জিংকগো-বি ৬০

জিংকগো বিলোবা

উপাদান

জিংকগো-বি ৬০ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে জিংকগো বিলোবা নির্যাস ৬০ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজী

জিংকগো পাতার নির্যাসে রয়েছে ফ্লাভনয়েড গ্লাইকোসাইড এবং টারপিনয়েডস (জিংকগোলাইডস, বিলোবাইডস) যা অনুচক্রিকাকে প্রোটিনেট এন্টিভিটিং ফ্যাক্টরের (পিএএফ) সাথে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রেখে অনুচক্রিকা সমূহের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া এবং রক্তের বর্ধমান তারল্যকে দমন করে। এটি প্রুথসিস কমায়। ডিমেনশিয়াতে এটি চেতনা, কার্যকর স্মৃতি, স্বল্পমেয়াদি ভিজুয়াল মেমোরি, সেরেব্রাল অপ্রতুলতা, স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি ইত্যাদির উন্নতি ঘটায়।

নির্দেশনা

- সেরেব্রাল অপ্রতুলতা - স্মৃতিশক্তি লোপ, দুর্বল মনোযোগ, হতাশা, স্মৃতিহীনতা
- পেরিফেরাল ভাস্কুলার রোগ
- ভার্টিগো এবং টিনিটাস (কানে ভেঁ ভেঁ শব্দানুভূতি)

অন্যান্য ব্যবহার

- দেহে অক্সিজেনের ঘাটতি প্রতিরোধ
- তীব্র মধ্যকর্ণ বধিরতা
- এসএসআরআই ব্যবহারজনিত যৌন অক্ষমতা

সেবনমাত্রা ও সেবনবিধি

জিংকগো-বি ৬০ঃ ১-২ টি ক্যাপসুল দিনে ২-৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সেবনের স্থিতিকালঃ সেরেব্রাল অপ্রতুলতা- কমপক্ষে ৮ সপ্তাহ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার রোগ - কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ, ভার্টিগো ও টিনিটাস - কমপক্ষে ৬-৮ সপ্তাহ।

প্রতিনির্দেশনা

জিংকগো বিলোবা কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ইহা প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা ও সাবধানতা

সার্জারীর আগে জিংকগো বিলোবা সেবন বন্ধ রাখতে হবে, কেননা ইহা অপারেশন পরবর্তী রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

কদাচিৎ পাকস্থলী অথবা আন্ত্রিক গোলযোগ, মাথাব্যথা অথবা স্কিনে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

কোন সীমাবদ্ধতা জানা যায়নি।

শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ১২০ মি.গ্রা. মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত না।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া

এন্টিকোয়াগুলেটস, এন্টিপ্লেটলেট এজেন্ট, হেপারিন এবং থ্রম্বোলাইটিক এজেন্টগুলো রক্তপাত জটিলতার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

অতিমাত্রা

রক্তপাতের সময় ও রক্তপাত জটিলতার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

সংরক্ষণ

৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে, শুষ্ক স্থানে ও আলো থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্যাকিং

জিংকগো-বি ৬০ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি এইচ.ডি.পি.ই কন্টেইনারে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল।